

BERGE DU CAUCASE

(Heracleum mantegazzianum)

BERGE DU CAUCASE

(Heracleum mantegazzianum)

Plante herbacée vivace. Taille en floraison 2-4 m. Racines profondes en forme de carotte. Tiges vertes tachetées de rouge, creuses et fortes de 4-10 cm de diamètre, parsemées de poils forts et épars. Les feuilles peuvent atteindre des tailles impressionnantes de 1 à 2,5 m. Elles sont très divisées et la marge très découpée. Leur revers est complètement dépourvu de poils. Un plant peut posséder de une à huit inflorescences blanches en ombelles, dont la plus grande peut atteindre un diamètre de 80 cm, se situe sur la tige principale. Introduite par les amateurs d'horticulture, elle s'échappe rapidement des aménagements paysagers grâce à sa grande capacité à produire des graines. Elle colonise surtout les sols humides et riches, mais elle peut aussi envahir les fossés, les talus routiers et les terres en friche.



À ce jour, aucune berce du Caucase n'a été observée aux Îles-de-la-Madeleine.



IMPACTS

Contrairement à la berce laineuse, la berce du Caucase est exotique en Amérique du Nord. C'est surtout parce qu'elle représente une menace pour la santé qu'on connaît bien cette plante. Un groupe de molécules, les furanocoumarines, présentes dans toute la plante, agissent comme répulsif contre les insectes herbivores en nature. La présence de ces molécules dans la sève provoque chez l'humain des brûlures lors d'un contact cutané suivi d'une exposition au soleil. Des brûlures sévères au deuxième degré, avec cloques, peuvent se manifester 24-48 h après le contact.

LUTTE

Déclarer les observations au MELCCFP et aux organismes du milieu.

BERCE LAINEUSE

[Heracleum maximum]

BERCE LAINEUSE

[Heracleum maximum]

La berce laineuse n'est ni exotique ni envahissante. On la retrouve abondamment sur le territoire. Sa présence dans ce document sert surtout à bien connaître les caractéristiques qui la définissent puisqu'elle est souvent confondue avec la fameuse berce du Caucase.

Plante **indigène**. Plante herbacée bisannuelle ou vivace. Taille en floraison 1-2 m. Racines profondes en forme de carotte. Tige verte à légèrement pourpre, 1-5 cm de diamètre, creuse, poils duveteux. Les feuilles sont grandes, jusqu'à 40 cm, largement divisées, marge irrégulière, avec poils duveteux au revers. Une à six inflorescences blanches en ombelles, dont la plus grande se situe sur la tige principale. Espèce indigène en Amérique du Nord.

LUTTE

Elle n'est pas considérée comme nuisible ou envahissante. Il n'y a donc pas lieu de l'éliminer. Par contre, pour des raisons de santé publique, on voudra limiter sa présence dans les endroits sensibles comme dans les parcs ou les cours d'école par exemple. La berce laineuse peut en effet poser des problèmes de santé. Un groupe de molécules, les furanocoumarines, présentent dans toute les parties de la plante, agissent comme répulsif contre les insectes herbivores en nature. La présence de ces molécules dans la sève provoque chez l'humain des brûlures légères lors d'un contact cutané suivi d'une exposition au soleil. Des brûlures légères peuvent se manifester en quelques heures ou quelques jours après l'exposition.





EN CAS DE CONTACT

En cas de contact avec la sève de la berce du Caucase ou de la berce laineuse, il faut retirer la sève avec un papier absorbant sans frotter, nettoyer la peau à l'eau froide et savonneuse et éviter l'exposition au soleil et aux rayons UV artificiels pendant 48h.

Tableau 1.

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE LA BERCE DU CAUCASE ET DE LA BERCE LAINEUSE.

	BERCE DU CAUCASE	BERCE LAINEUSE
CYCLE DE VIE	Plante herbacée vivace	Plante herbacée bisannuelle ou vivace
TAILLE	En floraison 2-4 m	En floraison 1-2 m
RACINE	Profonde en forme de carotte	Profonde en forme de carotte
TIGES	Vertes tachetée de rouge, creuses et fortes, 4-10 cm de diamètre, parsemées de poils fort et épars	Vertes à légèrement pourpres, creuses, 1-5 cm de diamètre, poils duveteux
FEUILLES	Peuvent atteindre des tailles impressionnantes de 1 à 2,5 m Très divisées, la marge très découpée, le revers des feuilles est complètement dépourvu de poils	Les feuilles sont grandes, jusqu'à 40 cm, largement divisées, marge irrégulière, avec poils duveteux au revers
INFLORESCENCES	Une à huit inflorescences en ombelles, dont la plus grande se situe sur la tige principale	Une à six inflorescences en ombelles, dont la plus grande se situe sur la tige principale
FLEURS	Petites, blanches, cinq pétales	Petites, blanches, cinq pétales
INCONVÉNIENTS	Brûlures au deuxième degré (sévères), boursoufflure, cloques, hyperpigmentation persistante	Brûlure légère possible